



**TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYZŐ NYILATKOZAT**

**Kedves Betegünk!**

Önt kezelőorvosa **CT (Computer Tomographia) vizsgálatra** utalta be, melynek gyors és zavartalan lefolyása érdekében szeretnénk tájékoztatni ennek menetéről és fontos feltételeiről.

A képképzés itt is röntgensugárral történik, mint a hagyományos radiológiai vizsgálatoknál. A CT vizsgálat magában fájdalommentes, de legtöbbször intravénás kontrasztanyagot is alkalmazunk, amely vénába adott injekciót jelent. Ha Ön cukorbeteg és tablettát szed betegségére (Adimet, Avandamet, Competact, Ebymect, Efficib, Eucreas, Formet, Glubrava, Glucient, Gluforlyn, Gluformin, Icandra, Janumet, Jentaduo, Komboglyze, Lyomet, Meforal, Meglucon, Merckformin, Metfogamma, Metformin, Metrivin, Mylmet, Normaglyc, Ristfor, Segluromet, Stadamet, Synjardy, Velmetia, Vildagliptin, Vilspox, Vipdomet, Vokanamet, Xigduo, Zomarist), a CT vizsgálat előtt és után két nappal (48 óra) a gyógyszer szedését szüneteltetni szükséges.

A ma alkalmazott intravénás kontrasztanyagok rendkívül jó minőségűek és alkalmazásuk biztonságos. A következő mellékhatások fordulhatnak elő:

- 1) Ritkán, kb. 100-200 esetből 1 alkalommal enyhe, átmeneti tünetek jelentkezhetnek, pl. melegségérzés, bőrvizketés, csalánkiütés, hányinger, remegés.
- 2) Nagyon ritkán, 1000-3000 esetből 1 alkalommal vérkeringési és légzési panaszok jelentkezhetnek.
- 3) Igen ritkán, 5000-10000 esetből 1 alkalommal léphet fel súlyos allergiás reakció.
- 4) Az injekció beadásának helyén előfordulhat a véna (visszér) gyulladása.

A felsorolt mellékhatások előfordulásának aránya nagyon kicsi, a szükséges vizsgálat viszont a betegségek kimutatásának szempontjából nagyon fontos. A vizsgálat elvégzésének kockázata jóval kisebb, mint az a veszély, amit az idejében fel nem derített betegség jelenthet. A mellékhatások elhárítására megfelelő gyógyszerek állnak rendelkezésre.

Has-medence CT vizsgálatnál a belek elkülönítésére 1-1,5 liter folyadékot szükséges elfogyasztani a tényleges vizsgálat előtt egy-másfél-két óra alatt. Ez lehet víz vagy vízben oldott nem felszívódó anyag (pl. jód vagy bárium). A fogyasztás ütemét munkatársunk közli Önnel és fontos, hogy ezt pontosan tartsa be. Az elfogyasztott nagy mennyiségű folyadék hasmenést okozhat (ez esetben kérjük, ezt azonnal jelezze).

A CT vizsgálat várható időtartama hozzávetőleg 5-15 perc. Intézetünk nagy betegforgalma miatt elképzelhető, hogy Önnek várakoznia kell. A sürgősséggel érkező, rossz állapotú betegek soronkívüliséget élveznek. Az időrendi eltolódások tudomásul vételét előre is köszönjük!

**Az intravénás kontrasztanyag beadásához szükséges az Ön beleegyezése. Kérjük, az alábbi kérdésekre szíveskedjen válaszolni (a megfelelő válasz aláhúzendó)!**

- |   |      |     |
|---|------|-----|
| 1) Kapott-e már intravénás kontrasztanyagot?  | igen | nem |
| 2) Ha igen, volt-e valamilyen mellékhatása?   | igen | nem |
| .....   |      |     |
| Kezelték-e, kezelik-e a jelenlegin kívül valamilyen komolyabb megbetegedés miatt?                           | igen | nem |
| .....   |      |     |
| 4) Van-e Önnek valamilyen allergiás betegsége?<br>(pl. szénanátha, asztma, valamilyen gyógyszerérzékenység) | igen | nem |
| .....   |      |     |
| 5) Nőbetegnek: terhes-e Ön?   | igen | nem |

Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal a vizsgálatot végző orvoshoz vagy asszisztenshez.

**A tájékoztatóban foglaltakat megértettem, a kért felvilágosítást megkaptam.**

**Intravénás kontrasztanyag alkalmazásába:**

**beleegyezem**

**nem egyezem bele.**

(A MEGFELELŐ VÁLASZ ALÁHÚZANDÓ!)

Miskolc, .....

.....

Dátum

A beteg (törvényes képviselője) aláírása

Köszönjük, hogy együttműködésével megkönnyítette és segítette munkánkat, melyet az Ön egészsége érdekében végzünk!